



結核病

認識這個傳染性高的疾病



患有結核病的人不一定有徵狀。要預防與結核病的相關問題，您必須學習洞察一些早期徵狀。

什麼是結核病？

結核病是一種傳染病。結核病通常感染肺部，但也可能感染身體其他各部位。它可以透過咳嗽或飛沫傳播。在封閉的空間裡，結核病能夠更容易地散播。缺乏醫療保健、居住在擁擠的環境中、或是營養不良的人都是得病的高危人士。即使您感染結核病多年，也不一定感覺自己患病。

結核病的徵狀

如果您曾與感染結核病的人接觸，或以下的徵狀，請前往接受檢查：

- ▶ 呼吸困難
- ▶ 呼吸時胸痛
- ▶ 久咳
- ▶ 咳血
- ▶ 夜間發燒和盜汗
- ▶ 食慾不振及非自願地體重下降
- ▶ 不明所以地疲倦或虛弱

您的醫生會為您進行可診斷是否患有結核病的皮膚測驗。他可能會檢驗您咳嗽的痰涎，甚至為您進行胸部X光檢查。

哪些人會得到結核病？

每20個人中就有1個人感染結核病。

某些人較其他人較容易感染結核病，例如：

- ▶ 成年男性為多，對比成年女性
- ▶ 有色人種
- ▶ 70歲以上的人
- ▶ 吸煙者
- ▶ 性病帶菌者

如何治療結核病？

您的醫生會給您多種的藥物，藥物療程長達六到九個月。某些類別的結核病有時需要服藥兩年方可痊癒。即使您覺得病情有所改善，也絕對不可停止服藥。請在停止服藥前預先徵詢醫生。病人一旦開始療程，他們就不能傳播結核病病菌。確保自己和其他人免受結核病感染。如果您擁有結核病的徵狀，或是曾與感染結核病的人接觸，請馬上和您的醫生會面。

